


ENERO 2022

## TEST DE ANTÍGENOS COVID-19

Son pruebas rápidas de detección de antígenos (PRDA) que detectan la presencia de antígenos en la muestra (glicoproteína S de la espícula viral y/o proteína N de la nucleocápside). Es imprescindible realizar el procedimiento de forma adecuada, incluida una correcta toma de muestra, de origen respiratorio (saliva o frotis nasal, nasofaríngeo o faríngeo).



### ¿Cuándo se debe realizar?

- 7 primeros días desde la infección
- 5 primeros días desde inicio de síntomas

En su interpretación influye la **sensibilidad** y **especificidad** del test y la **probabilidad pre-test**

**Sensibilidad:** capacidad para detectar a un sujeto enfermo (probabilidad de que el test identifique como enfermo a aquel sujeto que efectivamente lo está)


**Especificidad:** capacidad para detectar como sano al sujeto que lo está (probabilidad de que el test identifique como no enfermo a aquel sujeto que efectivamente no lo está)

Condicionada por la prevalencia de la infección y el contexto clínico y epidemiológico del paciente

### Test rápidos de autodiagnóstico de detección de antígenos general

Destinados para ser utilizadas por el público en general, en los que la misma persona se realiza la prueba recogiendo la muestra e interpretando el resultado, que se obtiene a los 10-15 minutos.

- o Venta exclusiva en farmacias/webs farmacias
- o No requieren prescripción médica
- o Debe constar de marcado CE +4 dígitos (Organismo Notificado evaluador)
- o Puede disponer o no de CN de Parafarmacia
- o Etiquetado e instrucciones en español



- Aislamiento en casa 7 días
- Autovigilar los síntomas
- Notificar el (+) al SAS (APP Móvil: Salud Responde)
- Avisar a contactos estrechos



No excluye la infección ni exime del cumplimiento de las medidas de control recomendadas

### CONTACTO ESTRECHO

Si **NO** está vacunado:

- Aislamiento en casa 7 días
- Vigilar la aparición de síntomas

Si está vacunado:

- Extremar precauciones 7 días
- Vigilar la aparición de síntomas

No se reconoce un test de antígeno de autodiagnóstico para certificar la recuperación ni para certificar la ausencia de infección activa

### AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES

#### Test rápidos de antígeno de uso profesional para su utilización por la población en general

- o Llevan marcado CE no acompañado de un número de 4 dígitos (evaluados por entidad independiente)
- o Sólo distribuyen a farmacias los test de muestra nasal

#### Test de autodiagnóstico certificados por Organismo notificado, pero no conformes con la legislación nacional

(Por ej. instrucciones en otros idiomas, debe cumplir con requisitos adicionales: adjuntar las instrucciones del producto en español)